



Gdańsk, 04 lipca 2025 r.

RDOŚ-Gd-WOO.442.3.2025.DN.1
/ePUAP/

**Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa**

Dotyczy: wystąpienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WST.441.4.2025.NR.1 z dnia 10.06.2025 r. (data wpływu: 11.06.2025 r.) w sprawie ewentualnego przystąpienia do przeprowadzenia postępowania transgranicznego **w sprawie wyboru potencjalnych lokalizacji morskich farm wiatrowych w fińskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej w obszarze Zatoki Botnickiej i Morza Botnickiego w Finlandii.**

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w tym pisma Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska DOOŚ-WST.441.4.2025.NR.1 z dnia 10.06.2025 r. wraz z załącznikami. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska **uznaje za zasadne przystąpienia Polski do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

Przedmiotowy projekt dotyczy wytypowania lokalizacji pod morskie farmy wiatrowe w obrębie fińskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Wytypowane zostały cztery lokalizacje pod potencjalne farmy wiatrowe, dwie z nich zlokalizowane są w obrębie Morza Botnickiego, a dwie w obrębie Zatoki Botnickiej.

No obecnym etapie nie przedstawiono założeń planu, ani nie wskazano jakie obszary planuje się przeznaczyć na poszczególne cele.

Najbliżej obszaru objętego przygotowywanymi planami znajdują się następujące polskie obszary Natura 2000:

- ok. 762 km na południowy - zachód Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002,
- ok. 780 na południowy – zachód Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032,
- ok. 781 na południowy – zachód Zatoka Pucka PLB220005.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: czerwiec 2025 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 **Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002** są gatunki: alka (*Alca torda*), nurnik (*Cephus grylle*), lodówka (*Clangula hyemalis*), nur czarnoszyi (*Gavia arctica*), nur rdzawoszyi (*Gavia stellata*), mewa srebrzysta (*Larus argentatus*), mewa siwa (*Larus canus*), uhl (*Melanitta fusca*) oraz markaczka (*Melanitta nigra*). Zagrożeniem dla obszaru są inne rodzaje aktywności człowieka związane z urbanizacją, przemysłem itd. Dla obszaru Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 nie został ustanowiony plan ochrony. Dnia 22.03.2023 r. obwieszczeniem znak IOW1.815.17.2023.MZI.1 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poinformował o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Poniżej zamieszczono analizę wpływu zamierzenia na tymczasowe cele ochrony ustanowione dla poszczególnych gatunków:

A001 – Nur rdzawoszyi (*Gavia stellata*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1 – 100 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w stanie właściwym (FV) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A002 – Nur czarnoszyi (*Gavia arctica*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1 – 12 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A064 – Lodówka (*Clangula hyemalis*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 2 750 – 7 150 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku występuje na obszarach tundry Euroazji i Ameryki Północnej. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A065 – Markaczka (*Melanitta nigra*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 350 – 3 000 osobników;

- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w stanie właściwym (FV) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 3000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A066 – Uhla (*Melanitta fusca*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1 600 – 11 700 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii, w tym też u jej wybrzeży. W związku z powyższym, zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A182 – Mewa siwa (*Larus canus*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 70 – 550 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym, nie będą one miały wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A184 – Mewa srebrzysta (*Larus argentatus*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1 250 – 7 300 osobników;

- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w stanie właściwym (FV) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym nie będą miały one wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A200 – Alka (*Alca torda*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie stanu populacji zimującej na poziomie 5 – 50 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 u wybrzeży Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 może być związane z zachowaniem tego gatunku w obszarach fińskich, a także zależne od dostępności szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A202 – Nurnik (*Cephus grylle*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1 – 7 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 194 673,70 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 u wybrzeży Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 może być związane z zachowaniem tego gatunku w obszarach fińskich, a także zależne od dostępności szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

Jak wykazano powyżej lokalizacja morskich farm wiatrowych w fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej może mieć wpływ na zachowanie większości gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) (Dz. U. z 2022 r. poz. 80) przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000 są następujące siedliska przyrodnicze: 1130 – estuaria, 1160 – duże płytkie zatoki, 1210 – kiczina na brzegu morskim, 1230 – klify na wybrzeżu Bałtyku, 1330 – solniska nadmorskie (*Glaucopuccinellietalia* część – zbiorowiska nadmorskie), 2110 – inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 – nadmorskie

wydmy białe (*Elymo-Ammophiletum*), 2130 – nadmorskie wydmy szare, 2180 – lasy mieszane i bory na wydmach morskich, 6410 – zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz 91D0 - bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne. Przedmiotem ochrony są również gatunki: parposz (*Alosa fallax*), foka szara (*Halichoerus grypus*), sierpowiec błyszczący (*Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*), minóg rzeczny (*Lampetra fluviatilis*), Inica wonna (*Linaria loeselii (Linaria odora)*), lipiennik Loesela (*Liparis loeselii*), wydra (*Lutra lutra*), czerwoczyk nieparek (*Lycaena dispar*) oraz morświn (*Phocoena phocoena*). Dla ww. obszaru Natura 2000 nie został ustanowiony plan ochrony. Dnia 18.01.2023 r. obwieszczeniem znak RDOŚ-Gd.WOC.6323.96.2022.MB.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Działania realizowane na fińskich obszarach morskich, ze względu na swoją znaczną odległość od ww. obszaru Natura 2000, nie będą miały wpływu na utrzymanie chronionych w jego granicach siedlisk przyrodniczych, a także gatunków związanych z środowiskiem lądowym takich jak: sierpowiec błyszczący, Inica wonna, czerwoczyk nieparek, czy wydra.

Zmiany na obszarze wód objętych fińskim Morskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie będą także wpływały na parposza i minoga rzecznoego, czy fokę szarą gdyż nie ma danych, które wskazywałyby, że populacje tych gatunków występujące w Polsce związane z wodami objętymi tym planem. Należy podkreślić, że populacja rozrodzka foki szarej występuje u wybrzeży Estonii i Szwecji. Populacja tego gatunku występująca u wybrzeży Finlandii jest populacją osiadłą. Jak wynika z danych projektu SAMBAH populacja morświna nie występuje na obszarze przewidzianym pod lokalizację fińskich farm wiatrowych, a jedynie na południe od niej. W związku z powyższym nie przewiduje się by lokalizacja farm wiatrowych na wytypowanym terenie mogła mieć wpływ na ten gatunek.

Jak wynika z powyższej analizy lokalizacja morskich farm wiatrowych w wytypowanych miejscach nie będzie wpływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: styczeń 2025 r.) przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 **Zatoka Pucka PLB220005** są gatunki: alka zwyczajna (*Alca torda*), czapla siwa (*Ardea cinerea*), czernica (*Aythya fuligula*), ogorzałka (*Aythya marila*), gągoł (*Bucephala clangula*), biegus zmienny (*Calidris alpina*), sieweczka obrożna (*Charadrius hiaticula*), lodówka (*Clangula hyemalis*), łabędź krzykliwy (*Cygnus cygnus*), łabędź niemy (*Cygnus olor*), łyska (*Fulica atra*), ostrzygojad zwyczajny (*Haematopus ostralegus*), mewa srebrzysta (*Larus argentatus*), uhlą (*Melanitta fusca*), bielaczek (*Mergus albellus*), nurogęs (*Mergus merganser*), szlachar (*Mergus serrator*), pliszka cytrynowa (*Motacilla citreola*), kulik wielki (*Numenius arquata*), kormoran czarny (*Phalacrocorax carbo sinensis*), perkoz rogaty (*Podiceps auritus*), perkoz dwuczuby (*Podiceps cristatus*), rybitwa białoczelna (*Sterna albifrons*), rybitwa rzeczna (*Sterna hirundo*), rybitwa czubata (*Sterna sandvicensis*) oraz ohar (*Tadorna tadorna*). Zagrożeniami dla obszaru są m.in.: usuwanie materiału z plaż, obszary portowe, tamy, wały i sztuczne plaże – ogólnie, prace związane z obroną przed aktywnością morza i ochroną wybrzeży, groble, szlaki żeglugowe, poligony, składowiska przemysłowe, żeglarstwo, rurociągi, kempingi i karawaningi, zarzucenie pasterstwa i brak wypasu, wydobywanie piasku i żwiru, lądowisko i heliport, wędkarstwo, turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych oraz osuszanie terenów morskich, ujściowych i bagiennych.

Dla ww. obszaru Natura 2000 nie został ustanowiony plan ochrony. Dnia 18.03.2022 r. obwieszczeniem znak IOW1.8103.1.2022.MZ.1 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poinformował o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000:

A005 – Perkoz dwuczuby (*Podiceps cristatus*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 700 – 1350 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 61243 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 200 – 4500 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku w nie pogorszonym stanie (FV) na powierzchni minimum 61243 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A028 – Czapla siwa (*Ardea cinerea*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji lęgowej na poziomie 240 – 350 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne gniazdowanie i odpoczynek w okresie lęgowym na dotychczasowym poziomie (FV) na powierzchni 2,5 ha.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza tego gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A036 Łabędź niemy (*Cygnus olor*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 2500 – 13500 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne żerowanie i odpoczynek w okresie zimowania na dotychczasowym poziomie (FV) na powierzchni 61243 ha.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca tego gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A038 – Łabędź krzykliwy (*Cygnus cygnus*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 24 – 650 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 120 – 1850 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii, w tym też u jej wybrzeży. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A048 – Ohar (*Tadorna tadorna*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji lęgowej na poziomie 14 – 25 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych siedlisk lęgowych i żerowiskowych na obecnym poziomie (U1) min. 235 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza tego gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A061 – Czernica (*Aythya fuligula*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 8500 – 30000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 2150 – 40000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii, w tym też u jej wybrzeży. W związku z powyższym

zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A062 – Ogorzałka (*Aythya marila*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 500 – 12500 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 100 – 12500 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii, w tym też u jej wybrzeży. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A066 – Uhla (*Melanitta fusca*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 500 – 14550 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 1050 – 6250 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii, w tym też u jej wybrzeży. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A067 – Gągoł (*Bucephala clangula*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 1050 – 7000 osobników;

- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 2000 – 10650 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i migrująca tego gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe oraz od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A068 – Bielaczek (*Mergus albellus*)

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 70 – 1550 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca ww. gatunku, populacja rozrodcza ww. gatunku chroniona jest m.in. w obszarach Natura 2000 na terenie Finlandii. W związku z powyższym zachowanie ww. przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 jest zależne od dostępności jego szlaków migracyjnych. Lokalizacja farm wiatrowych, które są przeszkodą na trasach migracji ptaków, może mieć wpływ na zachowanie ww. tymczasowych celów ochrony.

A069 – Szlachar (*Mergus serrator*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 200 – 1000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: nie określony z uwagi na brak lęgów na terenie ostoi;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne gniazdowanie, żerowanie i odpoczynek w okresie lęgowym na terenie rezerwatu Beka, na powierzchni 240 ha.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i rozrodcza tego gatunku. Populacje rozrodcze oraz zimujące tego gatunku występują także na południe od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku

będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A070 – Nurogęś (*Mergus merganser*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji lęgowej na poziomie 8 – 14 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych lęgówisk (FV) na powierzchni 2,5 ha.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 400 – 17000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i rozrodcza tego gatunku. Populacje rozrodcze oraz zimujące tego gatunku występują także na południe od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A125 – Łyska (*Fulica atra*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 6500 – 33500 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 4000 – 14000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja zimująca i wędrowna tego gatunku. Populacje rozrodcze tego gatunku występują na południe od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A137 – Sieweczka obrożna (*Charadrius hiaticula*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji lęgowej na poziomie 1 – 7 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: zwiększenie stabilnej powierzchni dogodnych siedlisk lęgowych i żerowiskowych (dążenie do poprawy oceny siedliska z U2 na min. U1) min. 54 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza tego gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A149 – Biegus zmienny (*Calidris alpina*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 1 – 13300 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”:
 - utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne żerowanie i odpoczynek w okresie migracji (U1) na długości wybrzeża 76 km;
 - zakaz poruszania się w ślizgu w odległości 1 kabla od linii brzegu oraz w rejonie ujścia rzeki Redy i Ryfu Mew zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznym Zatoki Puckiej.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja migrująca tego gatunku. Populacje rozrodcze i zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A160 – Kulik wielki (*Numenius arquata*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 1 – 50 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”:
 - utrzymanie stabilnego stanu siedlisk i miejsc wypoczynku (U1) w okresie migracji na powierzchni 200 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów;
 - zakaz poruszania się w ślizgu w odległości 1 kabla od linii brzegu oraz w rejonie ujścia rzeki Redy i Ryfu Mew zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznym Zatoki Puckiej.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja migrująca tego gatunku. Populacje rozrodcze i zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A184 – Mewa srebrzysta (*Larus argentatus*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 90 par;

- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie właściwych warunków umożliwiających efektywne gniazdowanie, żerowanie i odpoczynek w okresie lęgowym (U1) poprzez ograniczenie wpływu takich czynników i skutków antropopresji jak: niekontrolowany rozwój turystyki, płoszenie, wandalizm, nadmierne użytkowanie.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza ww. gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A191 – Rybitwa czubata (*Sterna sandvicensis*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 1 – 140 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”:
 - ograniczenie presji drapieżniczej w miejscu pojawiających się kolonii;
 - ograniczenie wpływu antropogenicznych czynników niekorzystnie wpływających na możliwość efektywnego gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, w tym prac związanych z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury portowej;
 - zachowanie stabilnej powierzchni 0,09 ha siedliska (FV) w miejscach podejmowania prób lęgu.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza ww. gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A193 – Rybitwa rzeczna (*Sterna hirundo*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 6 – 200 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: zachowanie stabilnej powierzchni siedliska (FV) w potencjalnych miejscach lęgowych o powierzchni 0,09 ha.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza ww. gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru przewidzianego do zajęcia pod farmy wiatrowe. Należy zauważyć, że populacja rozrodcza tego gatunku występuje także na terytorium Finlandii, jednak nie ma danych wskazujących by populacja ta była związana z populacją lęgową na terytorium Polski. W związku z lokalizacją farm wiatrowych w fińskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej nie będzie on miał wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A195 – Rybitwa białoczelna (*Sterna albifrons*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 1 – 35 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”:
 - ograniczenie presji drapieżników w miejscu pojawiających się kolonii;

- ograniczenie wpływu antropogenicznych czynników niekorzystnie wpływających na możliwość efektywnego gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, w tym prac związanych z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury portowej;
- zachowanie stabilnej powierzchni siedliska (FV) w potencjalnych miejscach lęgowych o powierzchni 0,09 ha w Porcie Północnym w Gdańsku.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza ww. gatunku. Populacje zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru przewidzianego do zajęcia pod farmy wiatrowe. Należy zauważyć, że populacja rozrodcza tego gatunku występuje także na terytorium Finlandii, jednak nie ma danych wskazujących by populacja ta była związana z populacją lęgową na terytorium Polski. W związku lokalizacją farm wiatrowych w fińskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej nie będzie on miał wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A391 – Kormoran czarny (*Phalacrocorax carbo sinensis*)

Typ populacji c:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji migrującej na poziomie 6500 – 22000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych żerowisk oraz miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) 61243 ha, z uwzględnieniem naturalnych procesów.

Typ populacji w:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie liczebności populacji zimującej na poziomie 4500 – 12000 osobników;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni 61243 ha dogodnych żerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) na terenie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja migrująca i zimująca tego gatunku. Populacje rozrodcze i zimujące tego gatunku występują na południe i zachód od obszaru planowanego do zajęcia pod lokalizację morskich farm wiatrowych. W związku z powyższym lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

A608 – Pliszka cytrynowa (*Motacilla citreola*)

Typ populacji r:

- wskaźnik „Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 7 – 11 par;
- wskaźnik „Stan siedlisk”: utrzymanie właściwych warunków (FV) umożliwiających efektywne gniazdowanie, żerowanie i odpoczynek w okresie lęgowym na terenie rezerwatu Beka, na powierzchni 80 ha.

Jak wskazano powyżej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 chroniona jest populacja rozrodcza ww. gatunku. Gatunek ten zimuje w południowej Azji. Należy zauważyć, że populacja migrująca oraz rozrodcza tego gatunku występuje także na terytorium Finlandii, jednak nie ma danych wskazujących by populacja ta była związana z populacją lęgową na terytorium Polski. lokalizacja przedmiotowych farm wiatrowych nie będzie miała wpływu na zachowanie populacji ww. gatunku w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Tymczasowe cele ochrony, w tym liczebność populacji i stan zachowania siedliska gatunku będącego przedmiotem ochrony w obszarze, nie będą zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia.

Jak wykazano powyżej lokalizacja farm wiatrowych na morzu w fińskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej może mieć wpływ na zachowanie części gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nie można wykluczyć istotnego oddziaływania transgranicznego na populacje gatunków ssaków i ptaków, w tym stanowiących przedmioty ochrony w polskich obszarach Natura 2000. Dlatego też podczas opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinno się zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

- zidentyfikowania istotnych oddziaływań na awifaunę, w tym pośredniego oddziaływania na osobniki gatunków oraz wpływu na parametry ich siedliska (np. na bazę żerowiskową) - biorąc pod uwagę najnowsze dane inwentaryzacyjne i monitoringowe dotyczące obserwowanych trendów zmian liczebności populacji bałtyckich gatunków ptaków morskich, ze wskazaniem możliwych środków minimalizujących te oddziaływania;
- analizy powiązań populacji ptaków występujących w fińskich obszarach Natura 2000 oraz stanowiących przedmiot ochrony w polskich obszarach Natura 2000 - Ławica Słupska PLC990001 i Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 (wspólne przedmioty ochrony obszarów, uwarunkowania biologii gatunków).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Anna Tchórzewska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. **Adresat, ePUAP**
2. Aa, sprawę prowadzi Dominika Nowak, tel. 58 68 36 812