

Asia: VN/7499/2021

Ehdotus laiva-apteekista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Yleiset huomionne ehdotuksesta

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne asetusluonnoksesta alla olevaan tekstikenttään

Laiva-apteekkiasetuksen liitteenä oleviin lääke- ja hoitotarvikelistoihin on tehty perusteltuja muutoksia ja lisäyksiä. Listoja on tarpeen päivittää muutaman vuoden välein saatavilla olevien valmisteiden ja pakkauskokojen, sekä hoitokäytäntöjen muuttuessa ja laivoilta tulleita tarpeita kuunnellen.

Apteekkariliitto pyytää huomioimaan lausunnossa olevat muutokset, jotta liitteet ovat asetuksen voimaantullessa ajan tasalla ja kaikki listan lääkkeet ovat Suomessa kaupan olevia lääkevalmisteita. Toisaalta pyydämme tarkastamaan mahdolliset päällekkäisyydet (kohta Ensihoitopakkaus), jotta voidaan välttää varustamoille syntyviä ylimääräisiä kustannuksia.

Liite 1 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Voitte kirjoittaa huomionne asetuksen liitteestä 1 alla olevaan tekstikenttään

KOHTA 7. INFECTIOIDEN LÄÄKKEET, ANTIMIKROBIT

- Keftriaksoni 1 g inj. inf.kuiva-aine -annostus muutettava
 - o Annostus viittaa Ceftriaxon MIP Pharma 1 g -valmisteseen, jota ei tällä hetkellä ole Suomessa saatavilla, eikä tietojemme mukaan sitä ole kahteen vuoteen tulossa. Vastaava saatavilla oleva valmiste on Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g 10 x 15 ml, mutta sen annostelusuositus poikkeaa hieman MIP Pharman valmisteesta. Voisiko listalla olevan annosohjeen muuttaa seuraavasti:

ANNOSTUS: Vain lääkärin ohjeen mukaan. 1–2 g (vakavissa infektioissa enintään 4 g) kerran vuorokaudessa. Kuiva-aine liuotetaan juuri ennen käyttöä. Annetaan ensisijaisesti laskimoon (i.v.) vähintään 2–4 5 minuutin aikana suoraan suoneen (liuotettuna 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä) tai infuusioletkun kautta infuusiona laskimoon 0,9 % NaCl-infuusionesteessä vähintään 30 minuutin aikana. Ellei iv-annostus onnistu, annetaan lihaksensisäisesti (i.m.) syvälle

pakaralihakseen (liuotettuna valmisteesta riippuen 3 - 3,5 ml:aan 1 % lidokaiinihydrokloridiliuosta). Samaan lihakseen ei suositella annettavaksi yli 1 g:n kerta-annoksia.

- Laiva-apteekkiin tulee lisätä keftriaksonin i.v. annostelua varten injektionesteisiin käytettävä vesi: Aqua sterilisata inj. liuos 10 x 20 ml. Steriiliä vettä voidaan käyttää myös esimerkiksi tietyn tyyppisen virtsakatetrin (suolakerroksen sisältämä Lofric) liukastamiseen (muiden katetrien kohdalla käytetään lidokaiinigeeliä). Aqua sterilisatan voinee lisätä kohtaan 7 keftriaksonin alle.

Liite 2 Vaarallisia aineita sisältävän lastin edellyttämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Voitte kirjoittaa huomionne asetuksen liitteestä 2 alla olevaan tekstikenttään

Listalla on budesonidi inhalaatioaerosolina: Budenosidi (mukana tilajatkke) inhalaatioaerosoli 200 µg/annos. ANNOSTUS: 400 µg toistetusti tarvittaessa (2 x 200 µg). KÄYTTÖOHJE: MFAG-opas: Taulukko 9.

- Budesonidia on markkinoilla ainoastaan jauheinhalaattorina, eikä siis yhtään valmistetta, jonka voisi inhaloida tilanjatkkeella. Voisiko tähän laittaa tilalle / vaihtoehdoksi ekvipotentin inhaloitavan beklometasonin (löytyy inhalaatioaerosolina 100 mikrog/dos vahvuutena)? Olisi siis:

Beklometasoni inhalaatioaerosoli 100 mikrog/dos (+ tilanjatkke). ANNOSTUS: 4 suihkausta (4 x 100 mikrog) toistetusti tarvittaessa. KÄYTTÖOHJE: MFAG-opas: Taulukko 9

Liite 3 Ensihoitopakkaus

Voitte kirjoittaa huomionne asetuksen liitteestä 3 alla olevaan tekstikenttään

YLEINEN HUOMIO: Voivatko ensihoitopakkauksen elvytysvälineet sisältyä liitteen 1 ja 2 hoitotarvikkeisiin, vai pitääkö Ensihoitopakkauksessa olla nämä tuplana? Tämä on jäänyt vuoden 2015 asetuksessa huomiotta ja asiaa on tulkittu eri tavoin. Olisi tärkeitä, jos mainittaisiin, että Ensihoitopakkaukseen tulevat elvytysvälineet saavat sisältyä liitteen 1 ja 2 hoitotarvikkeisiin (laiva-apteekkiasetuksen 2§:ssä mainitaan liitteen 2 lääkkeitä ja hoitotarvikkeita). Koska itse asetuksen tekstiä ei nyt avata, voisiko tiedon lisätä liitteeseen 3 esim. seuraavasti:

Jos liitteen 3 mukaisia hoitotarvikkeita jo sisältyy aluksen laiva-apteen liitteen 1 mukaisiin hoitotarvikkeisiin, voidaan liitteen 3 mukaisia hoitotarvikkeiden määriä vähentää vastaavasti.

5. HAAVAN JA PALOVAMMAN HOITO

- o Listalle on lisätty kiristyside (Tourniquet). Listalla kohdassa 3 INSTRUMENTIT JA SIDETARPEET on staassi, joka on myös kiristyside (ilmeisesti i.v.-annosteluun valmistamista varten). Tarvitaanko molempia?

Liite 4 Pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Voitte kirjoittaa huomionne asetuksen liitteestä 4 alla olevaan tekstikenttään

Ei kommentoitavaa

Sandler Charlotta
Suomen Apteekkariliitto