

# Vuoden 2030 tavoitetasot

Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö



VALTIONEUVOSTO  
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö  
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö  
Jord- och skogsbruksministerie

# Vuoden 2030 tavoitetasot

- **Ennallistettava luontotyyppien kokonaispinta-ala** (km<sup>2</sup>) eli pinta-ala, jolla tehdään ennallistamistoimia. Pinta-alan on vastattava vähintään 30 %:a kaikesta ei-hyvässä tilassa olevasta luontotyyppipinta-alasta
- **Luontotyyppiryhmäkohtaisesti** pinta-ala (km<sup>2</sup>), jolla tehdään **palauttamistoimia**. Vähintään 30 % kokonaispalauttamistavoitteesta
- **Luontotyyppien yhteenlaskettu tuntematon pinta-ala** ja vapaat tekstikuvaukset, miten tietopuutteet paikataan. Vuoteen 2030 mennessä 90 % kaikista tietopuutteista.

# Ennallistettava pinta-ala (tavoite 30 %)

- Kokonaistavoite n. 3,5 milj. ha
- Realistinen tavoitetaso n. **21 %** (750 000 ha), nykytoimin päästäisiin n. **18 prosenttiin** (650 000 ha)
- **Vesien- ja merenhoidon suunnitelmien toimenpiteiden täysimittainen toimeenpano** on avainasemassa => voidaan arvioida että suurimmalla osalla sisävesi- ja rannikkoluontotyyppien pinta-alaa riittävät toimet hyvän tilan palauttamiseksi olisi tehty jo v. 2030 mennessä (79 % sisävesiluontotyyppien kokonaistavoitteesta)
- **Laaja-pinta-alaisten suoluontotyyppien** osalta ennallistamistavoite on <10 % eikä 30 % tavoitetta saavuteta ennen vuotta 2050
- Metsien osalta ennallistamistavoite on vielä puutteellinen, sen määrittely edellyttää vielä päätöstä bor. luonnonmetsien ja harjumetsien määritelmistä tai niiden tulkinnasta
- Muissa luontotyyppiryhmissä pyritään n. 30 % tavoitteeseen huomioiden erityisesti pienialaiset uhanalaiset luontotyypit
- Tunturikankaiden ja -koivikoiden osalta tavoitetta ei aseteta lähivuosille ja toimet jäävät pääosin v. 2030 jälkeiselle ajalle

# Palautettava pinta-ala (30 %)

- Palautettavasta pinta-alasta **suurin osa on boreaalisia luonnonmetsiä** => valittava tavoitetaso ja määritelmän tulkinta vaikuttaa merkittävästi kokonaispinta-alaan
- Luonnonsuojelualueilla on arvioitu olevan jopa 300 000 ha metsiä, jotka palautuvat aikaa myöten boreaaliseksi luonnonmetsiksi ilman aktiivisia toimia
- Useimpien luontotyyppien osalta palautettavat pinta-alat ovat pieniä tai palauttamisen tarvetta ei ole. Lyhyen aikavälin palauttamismahdollisuuksia on lisäksi vaikea arvioida. Esim. perinnebiotooppeja palautuu olemassa olevien esiintymien hoidon ja kunnostuksen yhteydessä
- Laajapinta-alaisille suoluontotyypeille ei ole asetettu palauttamistavoitteita, mutta myös niitä palautuu erityisesti laajempien suoalueiden ennallistamisen yhteydessä

# Tietopuutteet ja tuntematon pinta-ala

- Tietopuutteet pyritään paikkaamaan seurannan kehittämistä koskevien toimenpide-ehdotusten avulla
- Vuoteen 2030 mennessä 90 % tavoitetta ei vielä tulla saavuttamaan, mutta kaikki tietopuutteet pyritään paikkaamaan asetuksen mukaisesti v. 2040 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin resurssien kohdentamista nykyistä enemmän erityisesti seurantaan ja inventointeihin

# Taulukosta

- Ennallistamis- ja palauttamistavoitteiden luontotyyppiryhmäkohtaiset luvut v. 2030 löytyvät luontotyyppitaulukon kolmannelta välilehdeltä
- Palauttamistavoitteiden luvut (sarake E) ovat osin viitteellisiä ja yhteissummasta puuttuvat vielä boreaalisten luonnonmetsien ja mahdollisesti harjumetsien palauttamistavoitteet
- Ennallistamistavoitteiden osalta on esitetty ns. realistinen tavoite (sarakkeet G-H) ja arvio nykytoimien vaikuttavuudesta (sarakkeet I-J)