

Suomen Siipikarjaliitto ry
Keskuskatu 21
31600 JOKIOINEN
Puh. 03 438 4737

Lausunto

4.9.2013

Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Lausuntopyyntö dnro YM028:00/2011

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Liite 1: Lantavarastojen ohjetilavuudet

Haluamme tuoda työryhmän tietoon käytännön siipikarjatilojen näkemyksiä lantamääristä ja lannantuottoon vaikuttavista asioista, ja pyydämme korjaamaan liitteessä esitettyjä lukuja todellisen varastotilatarpeen mukaisiksi.

Siipikarjataloudessa eläinainees on kehittänyt viime vuosikymmenellä nimenomaan rehunkäyttökyvyltään; vaikka munia tai lihaa tulee enemmän kuin ennen, ne tuotetaan vähemmällä rehulla tuotekiloa kohti eikä eläimen kokonaisrehunkulutus sinänsä ole lisääntynyt. Tähän vaikuttaa myös rehujen sisällön tarkka optimointi linnun tarpeita vastaavaksi ja rehuaineiden sulavuuden parantuminen rehuteknisten käsittelyjen avulla sekä rehuentsyymejä lisäämällä. Esim. broilereita kasvatetaan edelleen noin kuusi erää vuodessa. Emokanojen, varsinkaan broileriemojen tuotantokausi ei ole läheskään vuoden mittainen.

Myös lintujen hoitotavat ovat muuttuneet: Eläimillä on enemmän tilaa, kun uudet eläinsuojelumääräykset ovat pienentäneet tiheyttä niin broilerikasvattamoissa kuin kanojen varusteluissa häkeissä. Rakennusten ilmanvaihtoa on tehostettu, ja kuiviketta käytetään vähemmän kuin aikaisemmin. Siipikarjarakennuksista ulos tuleva lanta on siksi entistä kuivempaa. Esim. broileritilat on ohjeistettu levittämään kuiviketurvetta n. 2 cm kerros, tämä tekee 1,18 litraa broileria kohti, 160 kilon kuutiopainolla n. 190 g/broileri. Alan yhteinen näkemys, jonka esim. Biolan Oy vahvistaa, on että broilerihalliin tuotu kuivikemäärä on kasvanut 1,7-kertaiseksi lintujen lähdettyä teuraaksi (ja lannan takaisin Biolaniin multa- ja lannoitetuotteiksi jalostettavaksi).

Kalkkunoilla kuiviketta käytetään noin 0,012 – 0,03 m³/lintu. Erot kuivikkeiden käytössä aiheuttavat vaihtelua lantamääriin tilojen välillä ja varastotilamitoitusta on vaikea ohjeistaa yhdellä luvulla. Kalkkunatiloilla ei ole havaittu ongelmia nykykäytännössä. Siipikarjaliiton Kalkkunajaosto esittääkin nykyisten mitoitusohjeiden säilyttämistä.

Lattiakanoista suurin osa on ns. kerroslattiakanaloissa, joissa pohjalla (lattialla) on niukasti kuiviketta ja lanta poistetaan tiheästi rutiläkerrosten välissä olevilta lantamatoilta, joilla se ehtii kuitenkin kuivahtaakin (näin tapahtuu luonnollisesti myös häkkikanaloissa).

Kun otetaan huomioon lannan tilavuuden pieneneminen varastossa sen kuivuessa ja kompostoitua, nykyiset Kotieläintalouden ympäristöohjeen 1/2010 lantavarastojen ohjetilavuudet ovat täysin riittävät. Turhien neliöiden rakentaminen lantaloihin ei ole järkevää tilojen kustannuspaineissa, eikä myöskään tällaisten investointien tukeminen valtiontalouden kannalta. Siipikarjaliitto ja Broileryhdistys toimittavat mielellään lisätietoa tiloilla syntyvistä lantamääristä varastotilatarpeen laskemiseksi.

Suomen Siipikarjaliitto ry
toiminnanjohtaja Lea Lastikka
p. 03 438 4737

Suomen Broileryhdistys ry
puheenjohtaja Hanna Hamina
p. 050 573 0773