

## Rajattu lääkkeenmääräminen

### 1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen ky (Siun sote)

### 2. Arviokaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi.

Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle. | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.   | 0                       | 1                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä  | 1                       | 1                             | 0                             | 0                       | 0             | 2        | 1,5       |

### 3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ostopalveluissa vastuusta voi tulla monimutkaista.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Ei vastauksia.

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuutokset | Melko tarkoituksenmuutokset | Melko epätarkoitukset | Epätarkoitukset | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 5 § Rajattu lääkkeen määrääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin. | 1                     | 0                           | 0                     | 0               | 0             | 1        | 1         |
| Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.  | 1                     | 0                           | 0                     | 0               | 0             | 1        | 1         |
| 10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.                           | 1                     | 0                           | 0                     | 0               | 0             | 1        | 1         |
| Yhteensä  | 3                     | 0                           | 0                     | 0               | 0             | 3        | 1         |

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Kauppanimen käyttö on vakiintunut käytäntö lääkäreillä, vaikka vaikuttavalla aineella määrääminen olisikin optimaalista. Kirjava käytäntö olisi omiaan sekoittamaan ja vaaratilanteiden määrä voisi kasvaa.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskisarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|
| J01FA10, atsitromysiini; klamydia   | 1                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 1          |
| J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville | 1                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 1          |
| Yhteensä  | 2                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 2        | 1          |

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

## 8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Perusterveydenhuollon avovastaanoton päivittäistä rutiinia, mikä ei kokeneelle sairaanhoitajalle ole vaikeaa.

9. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskisarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|
| J01DB01, kefaleksiini; nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä | 1                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 1          |
| S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula   | 1                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 1          |
| Yhteensä  | 2                       | 0                             | 0                                 | 0                           | 0             | 2        | 1          |

## 10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Perusterveydenhuollon avovastaanoton päivittäistä rutiinia, mikä ei kokeneelle sairaanhoitajalle ole vaikeaa.

## 11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville   | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| Yhteensä   | 2                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 2        | 1         |

## Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

## 12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|                                  | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksellinen | Melko epätarkoituksellinen | Epätarkoituksellinen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| R06AE07, setiritsiini            | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AE09, levosetiritsiini        | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX13, loratadiini             | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX18, akrivastiini            | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX22, ebastiini               | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX26, feksofenadiini          | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX27, desloratadiini          | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R06AX29, bilastiini              | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R01AC01, dinatriumkromoglikaatti | 0                       | 1                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 2         |
| R01AC02, levokabastiini          | 1                       | 0                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 1         |
| R01AC03, atselastiini            | 0                       | 0                       | 0                          | 0                    | 1             | 1        | 5         |
| Yhteensä                         | 9                       | 1                       | 0                          | 0                    | 1             | 11       | 1,45      |

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksellinen | Melko epätarkoituksellinen | Epätarkoituksellinen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiisaivotulehdusrokote | 0                       | 1                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 2         |
| Poistetaan: J07BK, vesirokko                             | 0                       | 1                       | 0                          | 0                    | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä   | 0                       | 2                       | 0                          | 0                    | 0             | 2        | 2         |

## 16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

## 17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksemukainen | Epätarkoituksemukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille | 0                       | 1                             | 0                            | 0                      | 0             | 1        | 2         |
| G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle   | 0                       | 1                             | 0                            | 0                      | 0             | 1        | 2         |
| G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle   | 0                       | 0                             | 0                            | 0                      | 0             | 0        |           |
| Yhteensä  | 0                       | 2                             | 0                            | 0                      | 0             | 2        | 2         |

## 18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti  | 0                       | 1                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 2         |
| C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti                                    | 0                       | 1                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 2         |
| C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti                              | 0                       | 1                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 2         |
| C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti                | 0                       | 1                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 2         |
| C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti | 0                       | 0                             | 1                                 | 0                           | 0             | 1        | 3         |
| C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu   | 0                       | 0                             | 1                                 | 0                           | 0             | 1        | 3         |
| C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu   | 0                       | 0                             | 1                                 | 0                           | 0             | 1        | 3         |
| C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu   | 0                       | 0                             | 1                                 | 0                           | 0             | 1        | 3         |
| B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitromboottinen hoito   | 0                       | 1                             | 0                                 | 0                           | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä   | 0                       | 5                             | 4                                 | 0                           | 0             | 9        | 2,44      |

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä  | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |

#### 24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat            | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD07, metformiini ja sitagliptiini              | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD08, metformiini ja vildagliptiini             | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD10, metformiini ja saksagliptiini             | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD11, metformiini ja linagliptiini              | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD13, metformiini ja alogliptiini               | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD18, metformiini ja gemigliptiini              | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| A10BD22, metformiini ja evogliptiini               | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä   | 0                    | 9                          | 0                              | 0                        | 0             | 9        | 2         |

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

## 26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Edellyttää hyvää konsultaatiomahdollisuutta.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| R03BA, glukokortikoidit                         | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni             | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| R03AK07, formoteroli ja budesonide              | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| R03AK08, formoteroli ja beklometasoni           | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä  | 0                    | 5                          | 0                              | 0                        | 0             | 5        | 2         |

## 28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Edellyttää hyvää konsultaatiomahdollisuutta.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD             | 0                    | 0                          | 1                              | 0                        | 0             | 1        | 3         |
| R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD              | 0                    | 0                          | 1                              | 0                        | 0             | 1        | 3         |
|  |                      |                            |                                |                          |               |          |           |

|  |   |   |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|---|---|---|------|
| R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3    |
| <b>Yhteensä</b>                                    | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,75 |

### 30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| R06AE07, setiritsiini                                 | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AE09, levosetiritsiini                             | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX13, loratadiini                                  | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX18, akrivastiini                                 | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX22, ebastiini                                    | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX26, feksofenadiini                               | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX27, desloratadiini                               | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R06AX29, bilastiini                                   | 1                    | 0                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet    | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito | 0                    | 1                          | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| <b>Yhteensä</b>                                       | 8                    | 2                          | 0                              | 0                        | 0             | 10       | 1,2       |

### 32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

|                                  | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg) | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| M01AE02, naprokseeni             | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| N02BE01, parasetamoli            | 1                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| Yhteensä                         | 3                       | 0                             | 0                             | 0                       | 0             | 3        | 1         |

### 34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn | 0                       | 1                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 2         |
| G02BA03, progesteronia sisältävä muovierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle  | 0                       | 1                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 2         |
| G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle  | 0                       | 1                             | 0                             | 0                       | 0             | 1        | 2         |
| Yhteensä   | 0                       | 3                             | 0                             | 0                       | 0             | 3        | 2         |

### 36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

### 37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys | 0                       | 1                             | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |

### 38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

### 39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

|   | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito  | 1                       | 0                             | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 1         |
| N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti | 0                       | 1                             | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti | 0                       | 1                             | 0                              | 0                        | 0             | 1        | 2         |
| Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio  | 0                       | 0                             | 1                              | 0                        | 0             | 1        | 3         |
| Yhteensä  | 1                       | 2                             | 1                              | 0                        | 0             | 4        | 2         |

#### 40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

#### 41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Kuinka varmistetaan riittävä osaaminen näillä uusilla ja laajennetuilla hoitajavastaanotoilla? Onko 45 op riittävä sairaanhoitajalle, joka ei ole tehnyt vastaanottotyössä vaadittavaa hoidontarpeenarviointityötä? Uusi esityshän sallisi rajatun oikeuden esim. kotisairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon vastaanotoille työskenteleville.

Tk:ssa/päivystyksessä vastaanottotyötä tehneet hoitajat ovat arviointeja tehneet itsenäisesti jo ennen koulutukseen hakeutumistakin, joten se on antanut heille selkeän hyödyn ja lisäkokemusta myös lääkkeenmääräämistä ajatellen.

-Kuinka kirjava koulutuskokonaisuudesta tulee, jos muita opintoja voidaan hyväksilukea? Nykyisellään meidän on vaikea hahmottaa edes peruskoulutuksen lääkehoidon laajuutta.

-Lääkelistalle on nostettu lisää esim. verenpainelääkkeitä. Lääkkeitä käytetään myös monissa muissa sydänsairauksissa ja esim. migreeninkin hoidossa. Mitä enemmän lääkevalikoimaa on käytössä, sitä todennäköisemmin myös potilaiden ohjaaminen oikeaan paikkaan vaikeutuu ja konsultaatiotarve kasvaa kustannukset? /riskit?

-Lääkärin konsultointimahdollisuus esimerkiksi kotisairaanhoidossa. Tässä on jo nytkin paljon ongelmia. Kuinka pystytään turvaamaan lääkärikonsultaatio lääkemääräysluvan omaaville sairaanhoitajille? Toisaalta kotisairaanhoidosta tehdään paljon haittatapahtumailmoituksia. Resurssien, mutta myös osaamisen vajaus näkyvät ilmoituksissa.

-

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

|  | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmuuttaminen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| 4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.   | 0                       | 0                             | 0                                | 1                       | 0             | 1        | 4         |
| 6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälalueella, jolla hän tulee lääkeä määräämään.   | 0                       | 1                             | 0                                | 0                       | 0             | 1        | 2         |
| 7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikois pätevyyden edellyttämä koulutus. | 1                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0             | 1        | 1         |
| Yhteensä   | 1                       | 1                             | 0                                | 1                       | 0             | 3        | 2,33      |

#### 43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Osaamisen varmistamisen tarve jatkossa. Tulisiko meillä olla erillinen LOVe lääkkeenmääräämiseen oikeutetuille hoitajille, jos määrää ja osaamisaluetta on tarkoitus laajentaa? Osaaminen varmistetaan ennen määräysluvan saamista tenttein ja potilastapauksien kuvauksilla sekä kliinisellä potilaskokeella, mutta STM suosittaa lääkeosaamisen varmentamista kuitenkin 2-5 vuoden välein kaikilta lääkehoitoa toteuttavilta. Asettaako tämä muutospaineita koko systeemille?

-Kuinka täydennyskoulutus, osaamisen ylläpitäminen jatkossa? Onko tähän vaatimuksia?

-Vastuunjako. ”Edellytyksenä tulisi edelleenkin olemaan toiminnasta vastaavan lääkärin kirjallinen määräys siihen sisältyvine ehtoineen ja sairaanhoitajan välitön mahdollisuus konsultoida lääkäriä siten kuin lääkkeenmääräämisasetuksen 25 §:n 2 momentissa säädetään.” Käytännössä vastuut ostopalveluiden kohdalla, jos oikeus laajentuu myös sinne. Kuka on vastuulääkäri? Viime kädessä järjestäjän lääketieteellinen johto? Tuleeko liian monimutkainen ja vaikeasti hallittava vastuu?

#### 44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)