

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Vaasan keskussairaala, Turun yliopisto

2. Arvioi ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	0	0	0	1	0	1	4
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- En kannata sairaanhoitajien rajattua lääkkeenmääräisoikeutta

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeen määrääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkevalmisteen perusteella taikka lääkevalmisteen kaupan nimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	0	0	0	1	0	1	4
Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	0	0	0	1	0	1	4
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

6. Voit halutessanne perustella vastauksenne:

Ei vastauksia.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	0	0	0	1	0	1	4
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluvilje-lyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	0	0	0	1	0	1	4
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4

Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4
----------	---	---	---	---	---	---	---

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	0	0	0	
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	1	0	0	0	0	1	1
R01AC02, levokabastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC03, atselastiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	10	0	0	0	0	10	1

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Allergialääkkeet ovat käsikauppavalmisteita. Mielestäni sairaanhoitajan ei kuitenkaan tulisi kirjoittaa niistä reseptiä.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote	1	0	0	0	0	1	1
Poistetaan: J07BK, vesirokkorokote	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Rokotteiden ei tulisi olla reseptillä, kyseessä ei ole sairaudenhoito vaan terveydenhoito

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille	0	0	0	1	0	1	4
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	1	0	1	4
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiini johdokset; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C01DA02, glyceryylitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitromboottinen hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	6	0	6	4

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	0	0	0	1	0	1	4
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	0	0	0	1	0	1	4
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	0	0	0	1	0	1	4
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide	0	0	0	1	0	1	4

R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	0	1	0	1	4
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	8	0	0	2	0	10	1,6

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antihistamiinit ovat käsikauppavalmisteita

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	0	0	0	1	0	1	4
M01AE02, naprokseeni	0	0	0	1	0	1	4
N02BE01, parasetamoli	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	0	0	0	1	0	1	4
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	1	0	1	4
G02BB01, progestogeeniä ja estro-geeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste;silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	1	0	0	0	0	1	1

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Kyseessä on erityistyötekijän työväline

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	1	0	1	4
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	1	0	1	4
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Suuhygienistien tulisi toimia yhteistyössä hammaslääkärien kanssa, jotka vastaavat kyseisistä

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- En kannata kyseistä muutosehdotusta

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmuuttaminen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	0	0	0	0	1	1	5
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälalueella, jolla hän tulee lääketä määräämään.	0	0	0	0	1	1	5
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispatvevyyden edellyttämä koulutus.	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	3	3	5

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- En kannata mitään ylläolevaa ehdotusta

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)