

# Rajattu lääkkeenmääräminen

## 1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Tehyn Lääkkeenmäärämisen erikoispatvevyysjaosto "LäMä"

## 2. Arviokaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	1	0	0	0	0	1	1
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

## 3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Pidämme tärkeänä, että rajattua lääkkeenmäärämis-oikeutta ehdotetaan laajennettavaksi kunnan järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon avohoidon palveluihin, erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin sekä kunnan järjestämisvastuulle kuuluviin sopimuksen perusteella hankittaviin terveydenhuollon avohoidon palveluihin. Mikäli eduskunta hyväksyy maakunta- ja sote- lait, jolla järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille, edellyttää se muutosta myös rajattua lääkkeenmääräystä koskevaan lainsäädäntöön.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- Kaikki potilaan käynnit eivät vaadi perinteistä vastaanottokäyntiä, vaan digitalisaatio tuo erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa käynnit. Tulevaisuuden palveluja kehitetään nykyistä asiakaslähtöisemmäksi. Se tarkoittaa myös digitaalisten palveluiden käyttöönottoa asiakas- ja palveluohjauksessa sekä hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvioinnin yleistyessä nykyisiä säädöksiä tulee edelleen muuttaa, jotta sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeitä myös digitaalisessa hoitopolussa olevalle.

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeenmääräminen Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteiden kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	1	0	0	0	0	1	1
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	1	0	0	0	0	1	1
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

## 6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Kauppanimellä määrätessä nykyiset tietojärjestelmäongelmat poistuvat ja potilasturvallisuus paranee.

Virtsatieinfektiossa määriteltyä ikärajausta pitäisi arvioida uudelleen ja mahdollisesti laskea. Turvallinen ikäraja olisi 15-16 vuotta, jolloin sairaanhoitajan on turvallista määrätä lääke puhelin haastattelun perusteella ja asiakas pystyy kuvaamaan oireet luotettavasti.

## 7. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	1	0	0	0	0	1	1
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

## 8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Klamydia todennetaan laboratorionäytteiden mukaan ja hoito on määritelty tartuntatautilain mukaisesti ja Käypä hoito -suosituksessa.

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluviljelystä tai StrA-pikatestillä varmennetun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	1	0	0	0	0	1	1
S01AA01, kloramfenikoli; märkäisen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Kloramfenikolin käyttötarkoituksen laajentaminen näärännäppyyn on perusteltua.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

## 12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ei ole tarkoituksenmukaista rajata ikää. Muuten pivmesillinaami ja trimetopriimi ovat tärkeitä säilyttää rajattuun lääkkeenmääräämiseen. Aikaisempi liitteen 1 rajaus on riittävä

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	1	0	0	0	0	1	1
R01AC02, levokabastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC03, atselastiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	11	0	0	0	0	11	1

## 14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisaiivotulehdusrokote	1	0	0	0	0	1	1
Poistetaan: J07BK, vesirokko	0	0	1	0	0	1	3
Yhteensä	1	0	1	0	0	2	2

## 16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Esitämme, että asetukseen lisätään myös oikeus aloittaa pneumokokkrokote. Pneumokokki rokote suositellaan annettavan riskiryhmän aikuisille (astma, COPD). Konjugaattirokote estää ikääntyneillä vakavaa pneumokokkitautia ja keuhkokuumetta. THL:n arvion mukaan yksi kymmenestä keuhkokuumeesta on sellaisen pneumokokkityypin aiheuttama, jota vastaan konjugaattirokotus antaa suojaa. Sen lisääminen aloitettaviin lääkkeisiin sairaanhoitajan tarpeen arvioinnin perusteella helpottaisi potilaan saamaa hoitoa.

## 17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaille ja sitä vanhemmille	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

## 18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitromboottinen hoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	9	0	0	0	0	9	1

## 20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Reseptin voimassaoloaika on kaksi vuotta. Potilaan käydessä sairaanhoidajan vastaanotolla, arvioidaan potilaan kokonaistilanne, lääkkehoidon tarve ja ajantasaisuus sekä tehdään tarvittavat päivitykset.





C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	1	0	0	0	0	1	1
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	6	0	0	0	0	6	1

## 24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antikoagulaatiolääkehoidossa on paljon uusia lääkkeitä, joiden käyttö on yleistynyt ja käyttö on todettu turvalliseksi. Näiden lääkkeiden määräyksen jatkamista läkehoitosuunnitelman mukaisesti tulisi harkita.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksellinen	Melko tarkoituksenmuksellinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	1	0	0	0	0	1	1
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	1	0	0	0	0	1	1
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	9	0	0	0	0	9	1

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

## 26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Diabeteshoitajilla on vahvaa osaamista läikehoidon ohjaamisessa. Laajempi diabeteslääkkeiden (esim. GLP-1 ja SGLT-2 estäjä) valikoima parantaisi asiakkaan hoitotasapainon säilyttämistä.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	1	0	0	0	0	1	1
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	1	0	0	0	0	1	1
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	1	0	0	0	0	1	1
R03AK07, formoteroli ja budesonide	1	0	0	0	0	1	1
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	5	0	0	0	0	5	1

## 28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1

R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	4	0	0	0	0	4	1

### 30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	0	0	0	0	
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	0	0	0	
Yhteensä	8	0	0	0	0	8	1

### 32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmuuttaminen	Epätarkoituksenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	1	0	0	0	0	1	1
M01AE02, naprokseeni	1	0	0	0	0	1	1
N02BE01, parasetamoli	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

### 34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmuuttaminen	Epätarkoituksenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

### 36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

### 37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	1	0	0	0	0	1	1

### 38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

### 39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	1	0	0	0	0	1	1
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	1	0	0	0	0	1	1
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	1	0	0	0	0	1	1
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	4	0	0	0	0	4	1

#### 40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Valviran tilastojen mukaan kuudella laillistetulla suuhygienistillä on oikeus määrätä lääkettä vastaanottoimintaansa varten. Suun terveydenhuollossa karies on iso ongelma. Suuhygienistillä pitäisi olla mahdollisuus määrätä vahvempaa fluorihammastahnaa (5000 ppm ) yli 16 vuotiaille, kariesaktiivisille henkilöille. Myös antibioottiprofylaksia hammaskiven poiston yhteydessä sitä tarvitseville olisi tärkeä lisäys lääkkeenmääräämisasetukseen.

#### 41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Esitämme, että palvelun sujuvoittamiseksi myös muita potilasryhmiä voitaisiin hoitaa puhelinhaastattelun perusteella. Esimerkiksi rokotustarpeen määrittely puhelimesta joustavoittaisi toimintaa. Nyt asiakas joutuu hakemaan vastaanotolta erikseen lääkemääräyksen rokotteelle ja tulemaan uudelleen rokotettavaksi. Rokotuskäytännön kehittäminen potilaalle joustavammaksi ja helpommaksi saattaisi osaltaan parantaa rokotekattavuutta.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoituksenmuutokset	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	1	0	0	0	0	1	1
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälueella, jolla hän tulee lääketta määräämään.	1	0	0	0	0	1	1
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispatvevyyden edellyttämä koulutus.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

#### 43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Pidämme esitystä perusteltuna silloin, kun opintojen koulutustaso on samanarvoinen sisällöltään ja laajuudeltaan, jolloin nykyinen, korkeatasoinen koulutus säilyy.

Pääsyaatimuksena oleva rajausta kolmen vuoden työkokemuksen kertymisestä viimeisten viiden vuoden ajalta on hyvä. Se tukee tasa-arvoa ja kansainvälistä yhdenmukaisuutta sekä on yhdenmukainen ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavan työkokemuksen kanssa

#### 44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Rajattu lääkkeenmääräämiskoulutus on kallis (n. 4900 €), koska siihen ei ole valtion tukea siten kuin erikoistumiskoulutuksessa tai lääkärikoulutuksessa. Valtion tuen mahdollisuutta pitää arvioida uudelleen, koska se parantaisi toiminnan laajentamista ja kehittämistä. Nyt kustannukset jäävät työnantajille ja usein koulutukseen pääsy estyy.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)