

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Suomen Diabetesliitto ry

2. Arvioi ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	1	0	0	0	0	1	1
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- Lakiesityksessä hoitajien määrättävissä olevien lääkkeiden määrä laajenee ja hoitajien koulutukseen pääsyä edistetään. Lailla tavoitellaan myös kustannusten alentamista. Esityksen lähtökohdat ovat kannatettavia. Potilaan kannalta terveydenhuollon ammattihenkilön professio ei ole olennainen. Olennaista on, että potilas saa asianmukaisen diagnoosin sekä optimaalisen, tarpeensa mukaisen, vaikuttavan ja turvallisen lääkehoidon. Diabeteksen hoidon kannalta tarkasteltuna jatkovalmistelussa tulisi huomioida seuraavaa.

Tyypin 2 diabeetikot tarvitsevat tavallisesti useita eri lääkkeitä jatkuvasti päällekkäin. Ajalla 1.1-31.8.2017 diabeteslääkkeistä (ATC A10) korvausta saaneita oli 337 856 henkilöä. Heistä 318 289 henkilöä oli lisäksi ostanut sellaisia korvattavia lääkkeitä, jotka eivät kuulu ATC-ryhmään A10. Koska diabeetikon lääkehoito on usein monimutkainen kemiallisten yhteisvaikutusten sekoitus, ei esitys turvallisen lääkehoidon kannalta katsottuna aukottomasti edistä diabeteksen vaikuttavaa ja turvallista lääkehoitoa. Esitetyissä lääkkeissä on

valmisteita, joiden annosten säätäminen ja lääkeyhdistelmien yhdysvaikutukset esimerkiksi munuaisten vajaatoimintaa sairastavan diabeetikon kohdalla voivat olla jo lääkärille haasteellisia. Tiedetään myös, etteivät diabeetikot aina hoitosuosituksista riippumatta pääse tarvitsemaansa terveydenhuollon ammattihenkilön seurantaan (Diabetesbarometri 2017).

Diabeteksen lääkehoito ei myöskään onnistu ilman verensokerin omaseurantaa. Mahdollisuudet saada potilaan tarpeen mukaisia hoitotarvikkeita ja saada tarvetta vastaavaa määrää hoitotarvikkeita vaihtelee Suomessa potilaan asuinpaikkakunnan mukaan. Asianmukainen verensokerin omaseuranta on diabeteksen vaikuttavan ja turvallisen lääkehoidon ydin ja edellytys. Mikäli verensokeria ei voi hoidollisen tarpeen edellyttämällä tavalla seurata, ei diabeteksen lääkehoito ole rationaalista ja vaarantaa potilasturvallisuuden.

Omaseurannassa tarvittavien hoitotarvikkeiden laadun ja määrän ongelmat yhdistettynä siihen, että potilas ei pääse tarpeensa mukaiseen tai säännölliseen terveydenhuollon ammattihenkilön seurantaan, tekee hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamisen diabeteslääkkeiden osalta arveluttavan.

Lääkehoito on osa diabeteksen hoitoa. Lääkehoitoon sitoutumisen kannalta profissiota olennaisempaa on se, että diabeetikko tulee lääkkeen määräämisen yhteydessä kuulluksi ja ymmärretyksi ja että hän voi itse osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun. Potilaan mahdollisimman tasaveroisen kohtaaminen vastaanottotilanteessa edistää lääkehoitoon sitoutumista, millä on vaikutusta pyrittäessä rationaaliseen lääkehoitoon ja hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia.

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeenmäärääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	1	0	0	0	0	1	1
Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	1	0	0	0	0	1	1
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	2	1	0	0	0	3	1,33

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Ei vastauksia.

7. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	1	0	0	0	0	1	1
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	1	0	0	0	0	1	1
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	1	0	0	0	0	1	1
R01AC02, levokabastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC03, atselastiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	11	0	0	0	0	11	1

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiisaivotulehdusrokote	0	0	0	0	1	1	5
Poistetaan: J07BK, vesirokko	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	2	2	5

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksellinen	Melko tarkoituksenmuksellinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
B01AC06, asetyyylisilyylihapo; antitromboottinen hoito	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	0	1	0	8	0	9	3,78

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Diabetesta sairastavat ovat usein monisairaita, varsinkin ikäihmisillä on usein munuaisten vajaatoimintaa ja verisuonten ahtaumia ja he ovat diabeteksen lisäsairauksien vuoksi herkkiä sivuvaikutuksille. Verenpainelääkkeiden sopivuuden, vasta-aiheiden ja sivuvaikutusten arviointi ja yhteensovittaminen muuhun lääkehoitoon kuuluu lääkärille. Arvio olisi tehtävä vähintään vuosittain, vaikka reseptit voikin kirjoittaa kahdelle vuodelle. Kun lääkäri aloittaa hoidon, niin lääkettä uusivan on myös tarkkaan tunnettava lääkkeen käyttö, lääkkeiden yhteisvaikutukset, sivuvaikutukset, käyttö monisairailta potilailla. Tämä edellyttää lääkärin koulutusta.

C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	0	2	0	4	0	6	3,33

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	0	1	0	0	0	1	2
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	0	1	0	0	0	1	2
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	0	1	0	0	0	1	2
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	0	9	0	0	0	9	2

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- KS. KOHTA 4

Diabetesta sairastavien määrä ikäihmisissä lisääntyy voimakkaasti. Sekä Metforminin että DPP4 estäjien annostelu on sidoksissa munuaisten toiminnan asteeseen. Tämän arvioinnin osaaminen potilaan seurannassa on edellytys lääkereseptin jatkamiselle.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	0	0	0	0	1	1	5
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	0	0	0	0	1	1	5
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	0	0	0	0	1	1	5
R03AK07, formoteroli ja budesonide	0	0	0	0	1	1	5
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	5	5	5

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	0	0	0	0	1	1	5
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	0	0	0	0	1	1	5

R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	0	0	0	0	1	1	5
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	4	4	5

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	1	0	0	1	3
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	9	0	1	0	0	10	1,2

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	1	0	0	0	0	1	1
M01AE02, naprokseeni	1	0	0	0	0	1	1
N02BE01, parasetamoli	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	0	0	0	0	1	1	5
G02BA03, progesteronia sisältävä muovierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	0	1	1	5
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	3	3	5

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	0	0	0	0	1	1	5

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	1	0	0	0	0	1	1
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	1	0	0	0	0	1	1
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	0	1	1	5
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	1	4	2

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoitukset	Epätarkoitukset	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	1	0	0	0	0	1	1
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään.	0	0	0	1	0	1	4
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispatvevyyden edellyttämä koulutus.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	1	0	3	2

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- 6§: lääkehoidot kehittyvät ja muuttuvat erityisen nopeaan tahtiin. Lääkkeen määräämisoikeuden pätevyyttä tulee perustella terveys- ei työmarkkinapoliittisilla tavoitteilla. Viiden vuoden aikarajauksen poistaminen heikentäisi potilaiden lääkitysturvallisuutta.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)