

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä

2. Arviokaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	0	0	0	1	0	1	4
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Lääkäri vastaa aina potilaan lääkehoidosta ja myös sen kokonaisuudesta. Koska lääkkeiden ja lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä ja parantaa sairauksia ja hidastaa niiden etenemistä, ehkäistä sairauksien aiheuttamia komplikaatioita sekä lievittää sairauden aiheuttamia oireita, lääkkeiden määrääjällä tulee aina olla laaja-alaista lääketieteellistä osaamista, jotta potilaan turvallinen lääkehoito voi toteutua. Lääkkeiden määrääminen edellyttää syvällistä osaamista mm. anatomiasta, fysiologiasta, patofysiologiasta, tautiopista, farmakologiasta (farmakokinetiikasta, interaktioista, riskitekijöistä, haittavaikutuksista etc.), ja diagnostiikasta ja näitä opintokokonaisuuksia ei riittävästi voida turvata edes lisäkoulutuksella sairaanhoitajille, joiden tutkintokokonaisuuden pääpaino suuntautuu hoitotyön erityisosaamiseen.

Mikään lääke ole koskaan 100%:sti turvallinen. Epäasianmukaisesti toteutettu lääkehoito esim. väärän diagnoosin vuoksi on tehotonta mutta sen lisäksi se voi aiheuttaa myös vakavia potilasturvallisuusongelmia. Turhat tai epäasianmukaiset lääkehoidot lisäävät myös kustannuksia.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- Luonnoksessa ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrättävissä olevien lääkkeiden listan laajentamista. Erityisen huolestuttavaa luonnoksessa on mikrobilääkkeiden määräämisen laajentaminen. Sekä yksilön että kansanterveyden näkökulmasta tällä voi olla arvaamattomia seurauksia mikrobilääkeresistenssin laajenemiseen, jonka myötä mikrobilääkkeet muuttuvat tehottomiksi ja tämän seurauksena potilaita voi kuolla myös aivan banaaleihin infektioihin.

Luonnoksessa esitetään sairaanhoitajille oikeutta myös jatkaa joidenkin kipulääkkeiden määräämistä. Kipu on lähes aina oire jostakin sairaudesta, joka tulisi diagnosoida eikä hoitaa oiretta. Suomessa kuolee vuosittain noin 400 ihmistä mahasuolikanavan verenvuotoihin, jotka johtuvat tulehduskipulääkkeiden käytöstä. Tämän lisäksi kipulääkkeet voivat viivästyttää potentiaalisesti vakavien sairauksien diagnoosia ja altistaa potilaat näin ennenaikaiselle kuolemalle.

Potilailla, joilla on kroonisia sairauksia (diabetes, astma, allergia) lääkeshoidon tarve voi muuttua ja heille voi kehittyä uusia sairauksia, jotka tulisi diagnosoida. Vain lääkäriellä koulutuksensa myötä on ymmärrystä tunnistaa nämä signaalit, käynnistää tutkimukset, tehdä diagnoosi ja tehdä muutokset lääkeshoittoon.

Luonnoksessa on esitetty myös koulutusvaatimusten väljentämistä ja opintojen sisällön joustoa. Nämä entisestään heikentäisivät potilasturvallisuutta ja hoidon laatua Suomessa. Sairaanhoitajille tarjottua lisäkoulutusta ei voi verrata kansainväliseen Nurse Practitioner koulutukseen, joka on tutkintona huomattavan paljon laajempi. Nurse Practitioner-koulutus tutkinto edellyttää taustatutkinnoksi Bachelor`s Degree of Nursing (BSN) (sairaanhoitajan tutkintoa), jonka päälle opiskellaan kaksi vuotta kokopäivätoimisesti Master of Science in Nursing- tutkinto (MSN) tai 3-4 vuotta kokopäivätoimisesti Doctor of Nursing Practice- tutkinto (DPN, ND, PhD, DNSc). Vasta näiden tutkintojen jälkeen on mahdollisuus tehdä työtä Nurse Practitioner:na ja määrätä tiettyjä tarkoin määriteltyjä lääkkeitä potilaille.

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeen määrääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkevalmisteen perusteella taikka lääkevalmisteen kaupan nimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	0	0	0	0	1	1	5
Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	1	0	0	0	0	1	1
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	1	0	0	1	1	3	3,33

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Lääkärin tehtäviin kuuluu tehdä diagnoosi, arvioida hoidon tarve ja määrätä lääkehoito. Hän vastaa lääkehoidosta.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	0	0	0	1	0	1	4
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Sukupuolitautilien diagnostiikka ja hoito edellyttävät laaja-alaista lääketieteellistä osaamista, riskitekijöiden arviointia ja kykyä poissulkea myös muita sukupuolitauteja. Lääkäriin tulee myös huomioida kulloinkin epidemiologinen tilanne -myös globaalisti- ja hänellä tulee olla tietoa lääkeaineresistenssilanteesta lääkitystä valitessaan. Virtsatieinfektio-oireiden taustalla voi olla myös muita sairauksia kuin pelkästään alempien virtsateiden tulehdus. Nämä tulee poissulkea ennen lääkityksen aloitusta. Potentiaalisesti väärän hoidon valinta voi johtaa munuaiskomplikaatioihin ja verenmyrkytykseen.

9. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoitukset	Epätarkoitukset	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskisarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluviljelyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	0	0	0	1	0	1	4
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Nielutulehdus, rintatulehdus ja silmätulehdus edellyttävät diagnoosin tekemistä, joka on lääkärin tehtävä sekä lääkehoidon tarpeen arviota sekä asianmukaisen lääkityksen valintaa. Kefaleksiini on laajakirjoinen antibiootti, jonka käyttö edellyttää erityistä harkintaa ja tietyissä tilanteissa ko. lääke ei ole edes riittävä hoito nielu- tai rintatulehduksessa.

Kloramfenikolin paikallishoitoon liittyy riskejä, jotka tulee huomioida lääkettä määrättäessä. Vrt. FDA "Bone marrow hypoplasia, including aplastic anemia and death has been reported following local application of chloramphenicol. Chloramphenicol should not be used when less potentially dangerous agents would be expected to provide effective treatment". Sairaanhoidajan koulutus edes lisäkoulutuksella ei anna valmiuksia tehdä diagnoosia saati valmiutta arvioida asianmukaista turvallista lääkehoitoa.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoitukseenmuutokset	Epätarkoitukseenmuutokset	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Virtsatieinfektio-oireiden taustalla voi olla myös muita sairauksia kuin pelkästään alempien virtsateiden tulehdus. Nämä tulee poissulkea ennen lääkehoidon aloitusta. Potentiaalisesti väärän hoidon valinta voi johtaa vakaviin komplikaatioihin.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiriitsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiriitsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	0	0	0	1	0	1	4
R01AC02, levokabastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC03, atselastiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	11	0	11	4

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Allergisen nuhan hyvä hoito voi ehkäistä astman puhkeamisen. Allerginen nuha, allerginen silmätulehdus ja keuhko-oireet liittyvät läheisesti yhteen ja lääkitystä uusia tulee aina arvioida koko tautikirjo, mahdolliset muut oireet ja niiden hoito. Näiden asioiden laiminlyöminen voi pahimmillaan johtaa huonoon hoitotasapainoon, potilaan jatkuvaan oireiluun ja potentiaalisesti myös vakaviin keuhkokomplikaatioihin.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisaiivotulehdusrokote	0	0	0	1	0	1	4
Poistetaan: J07BK, vesirokkrokote	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	1	0	0	1	0	2	2,5

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Puutiaisaivokuumerokotuksen tarpeen arviointi edellyttää jatkuvasti muuttuvan infektioepidemiologisen tilanteen hallintaa ja riskin arviointia potilaan näkökulmasta (kaikki sitä haluavat eivät sitä todellisuudessa tarvitse).

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttokainen	Melko tarkoituksenmuuttokainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille	0	0	0	1	0	1	4
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	1	0	1	4
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksellinen	Melko tarkoituksenmuksellinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
B01AC06, asetyyliisalisyylihappo; antitromboottinen hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Nykyisin lääkereseptit ovat voimassa 2 vuotta. Krooninenkin sairaus edellyttää säännöllisesti vaikka harvakseltaankin määrävälein tapahtuvan lääkärin tilannearvion ja keskustelun potilaan kanssa, jonka jälkeen lääkärin tehtävänä on arvioida edellyttääkö lääkehoito muutoksia tai voidaanko lääkitys lopettaa kokonaan. Näin estetään komplikaatiot ja/tai turha lääkehoidon jatkaminen, jotka säästävät kustannuksia.

Lääkehoidon tarpeen arviointi / muutostarve kasvavalle nuorelle edellyttää laaja-alaista lääketieteellisistä osaamista, joten missään olosuhteissa ikäraja ei voi olla niin matala kuin lausunnossa on esitetty. Potilaan oirekuvan selvittäminen nuoruusiässä ei ole yksinkertainen asia, varsinkin kun kasvuvaiheessa anatomia ja fysiologia muuttuvat voimakkaasti ja lääkitystasapainoon vaikuttavat useat tekijät, mm. fyysisen rasituksen määrä ja laatu, liitännäissairaudet ja niiden lääkehoito.

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Nykyisin lääkeresepit ovat voimassa 2 vuotta. Krooninenkin sairaus edellyttää säännöllisesti vaikka harvakseltaankin määrävälein tapahtuvan lääkärin tilannearvion ja keskustelun potilaan kanssa, jonka jälkeen lääkärin tehtävänä on arvioida edellyttääkö lääkehoito muutoksia tai voidaanko lääkitys lopettaa kokonaan. Näin estetään komplikaatioita ja/tai turha lääkehoidon jatkaminen, jotka säästävät kustannuksia.

Lääkehoidon tarpeen arviointi / muutostarve kasvavalle lapselle/nuorelle edellyttää laaja-alaista lääketieteellisistä osaamista, joten missään olosuhteissa ikäraja ei voi olla niin matala kuin lausunnossa on esitetty. Potilaan oirekuvan selvittäminen lapsuus/nuoruusiässä ei ole yksinkertainen asia, varsinkin kun kasvuvaiheessa anatomia ja fysiologia muuttuvat voimakkaastikin ja lääkitystasapainoon vaikuttavat useat tekijät, mm. fyysisen rasituksen määrä ja laatu, muut liitännäissairaudet ja niiden lääkehoito.

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	6	0	6	4

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Nykyisin lääkereseptit ovat voimassa 2 vuotta. Krooninenkin sairaus edellyttää säännöllisesti vaikka harvakseltaankin määrävällein tapahtuvan lääkärin tilannearvion ja keskustelun potilaan kanssa, jonka jälkeen lääkärin tehtävänä on arvioida edellyttääkö lääkehoito muutoksia tai voidaanko lääkitys lopettaa kokonaan. Näin estetään komplikaatiot ja/tai turha lääkityksen jatkaminen, jotka säästävät kustannuksia. Antikoagulanttihoitokäytännöt ovat voimakkaassa murroksessa Suomessa ja varfariinin käyttöindikaatiot ovat jatkuvasti kaventuneet. Lääkärin tehtävänä on arvioida, missä tilanteissa on asianmukaista vaihtaa lääkitys mahdollisesti uuden polven koagulantteihin.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksellinen	Melko tarkoituksenmuksellinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	0	0	0	1	0	1	4
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	0	0	0	1	0	1	4
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidtaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Tyyppi 2 diabeteksen hoidossa keskeistä on lääkehoidon lisäksi arvioida potilaan kokonaistilannetta ja tunnistaa diabeteksen komplikaatiot mahdollisimman varhain ja varmistaa hoitokomplianssi. Mikäli tässä ei onnistuta, komplikaatioiden hoito on huomattavan kallista (amputaatiot, dialyysihoito jne.). Lääkeresepitit ovat voimassa kaksi vuotta. Vähintään kahden vuoden välein potilaalla tulee olla oikeus keskustella hoitavan lääkärin kanssa tautinsa hoidosta. Mikäli hoitokomplianssi on hyvä, lääkitystä voidaan myös purkaa mutta tätä ei voi tehdä sairaanhoidajan koulutuksella.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Ei vastauksia.

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Astman hoidossa keskeistä on lääkehoidon lisäksi arvioida potilaan kokonaistilannetta ja tunnistaa hoidon epätasapaino mahdollisimman varhain ja varmistaa hoitokomplianssi. Lääkereseptit ovat voimassa kaksi vuotta. Vähintään kahden vuoden välein astmaa sairastavalla potilaalla tulee olla oikeus keskustella hoitavan lääkärin kanssa tautinsa hoidosta.

Astman hoitotasapaino on käytännössä kaikkein huonoin 15-18 vuotiailla nuorilla. Tässä iässä vanhemmat yleensä siirtävät vastuun hoidosta nuorille itselleen, mutta samanaikaisesti nuoret tippuvat pois kouluterveydenhuollon palveluista. Juuri tuossa iässä erityisesti pojat kasvavat voimakkaasti ja toisaalta he aktiivisesti harrastavat liikuntaa. Hoitotasapainolle tämä asettaa erityisiä haasteita. Armeijaiikään saavuttaessa hoitotasapaino voi olla niin huono, että he joutuvat keskeyttämään varusmiespalveluksen ainoastaan sen vuoksi että heidän astman hoitotasapaino ei ole kohdallaan. Tilannekuvan hallinta ja korjaavat toimenpiteet edellyttävät erittäin laaja-alaista lääketieteellistä osaamista, jota on lääketieteellisen koulutuksen saaneelle lääkärillä. Myös aikuisilla työ- ja ympäristöperäiset altisteet ja liitännäissairaudet voivat aiheuttaa muutoksia hoitotasapainossa, ja nämä voivat edellyttää suuriakin muutoksia lääkehoitoon.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. kysymys 28.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	0	1	0	1	4
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	10	0	10	4

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	0	0	0	1	0	1	4

M01AE02, naprokseeni	0	0	0	1	0	1	4
N02BE01, parasetamoli	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. yllä.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	0	0	0	1	0	1	4
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	1	0	1	4
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoon varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	0	0	1	0	0	1	3

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	1	0	1	4
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	1	0	1	4
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmuuttaminen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	0	0	0	1	0	1	4
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälalueella, jolla hän tulee lääkeä määräämään.	0	0	0	1	0	1	4
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikois pätevyyden edellyttämä koulutus.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Viitataan aikaisempiin vastauksiin koulutuksen riittämättömyydestä turvaamaan turvallinen lääkehoito.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Viitataan aikaisempiin vastauksiin koulutuksen riittämättömyydestä turvaamaan turvallinen lääkehoito.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)