

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY)

2. Arviokaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	0	0	0	1	0	1	4
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Potilaan kokonaishoidosta vastuun kantaa lopulta lääkäri. NLY:n mielestä sairaanhoitajien rajattua reseptinmääräämisoikeutta ei tule laajentaa.

Sairanhoitajien rajattu reseptinmääräämisoikeus on ollut mahdollista jo useamman vuoden ajan, mutta vastuukysymykset ovat edelleenkin epäselviä. Toimintayksikön vastuulla on varmistaa, että reseptioikeuden omaavalla sairaanhoitajalla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Epäselväksi jää, siirtääkö konsultaatio vastuun konsultaatiovastauksen antavalle lääkärille ja onko konsultoiva lääkäri tällöin vastuussa vain konsultaatiovastauksestaan, lääkityksestä vai koko hoitokokonaisuudesta. Pitäisi myös varmentaa, että konsultaation antavat lääkärit ovat tietoisia reseptinkirjoitusoikeuden omaavan hoitajan diagnostisista ja lääkkeenmääräykseen liittyvistä rajoitteista.

Ministeriön omissa perusteluissa esitetään, että nykytilassa omavalvonta on riittämätöntä. Perusteluissa myös esitetään, että omavalvontaa suorittaa lääkäriyöpari. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan selvennetä, mikä on lääkärin vastuu ja miten lääkärin suorittamaa omavalvontaa valvotaan. Lisäksi ei ole selvitetty, millä ajalla lääkäri kyseessä olevan omavalvonnan suorittaa ja mikä lääkärin koulutustaustan tulee olla, jotta on hän on pätevä suorittamaan kyseistä valvontaa. Valvovan lääkärin tulisi olla näkemyksemme mukaan koulutukseltaan vähintään erikoislääkäri.

Erytyisesti nostamme huolen suunnitelmista laajentaa sairaanhoitajien rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta kotisairaanhoitoon, sillä työn luonteesta johtuen lääkärin konsultointi fyysisesti ei ole tarvittaessa mahdollista.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- Nykyinen ja ehdotettu lainsäädäntö tuntuu asettavan laajennetun reseptikirjoitusoikeuden omaavan hoitajan vaikeaan tilanteeseen. Lainsäädännön mukaisesti diagnoosin asettaminen kuuluu lääkärille, mutta hoitaja kirjoittaa reseptinsä muodostamalla oireista käsityksen "tautilasta" (hoidon tarpeen arvio). Miten tämä eroaa diagnoosista jää epäselväksi.

Laki myös vaatii:

"Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

4 luku

Erinäiset säännökset

24 §

Potilasasiakirjoihin tehtävät merkinnät ja erillinen kirjanpito

Lääkkeen määrääjän tulee kirjata kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset potilasasiakirjoihin siten, että merkinnästä ilmenee:

"Potilaalle kirjoitettujen lääkemääräysten osalta kirjanpitoon merkitään myös diagnoosi, suoritettut toimenpiteet ja annettu hoito."

"

Voiko hoitaja täyttää nykyisellään lain vaatiman potilasasiakirjamerkinnän periaatteen, jos hän ei voi laittaa sinne diagnoosia lääkemääräysten osalta? Mikä on hoitajan juridinen asema kirjauksia tulkittaessa?

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoitukset	Epätarkoitukset	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeen määrääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkevalmisteen perusteella taikka lääkevalmisteen kaupan nimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	0	0	0	1	0	1	4
Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	1	0	0	0	0	1	1
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	1	0	0	2	0	3	3

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Sairaanhoidajilla ei ole koulutuksensa puolesta riittäviä valmiuksia laajaan diagnostiikkaan tai kokonaisriskin arviointiin. Tämä kritiikki tuli ilmi myös esitysluonnoksen asiantuntijaselvityksessä. Vaikka lääkäri olisi tehnyt potilaalle hoitosuunnitelman, on ihmiselämä täynnä yllätyksiä ja hoitosuunnitelman paikkansapitävyyttä tulee joka hoitokontaktissa arvioida uudelleen. Monet lääkkeitä, joihin hoitajien reseptinmääräämis-oikeutta ollaan laajentamassa, voivat sisältää hengenvaarallisia komplikaatioita. Tällaisia ovat esimerkiksi metformiinin aiheuttama laktaattiasidoosi ja beetasalpaajiin liittyvät johtumishäiriöt. Näiden lääkkeiden määräämis-oikeus tulisi siten pysyä ainoastaan lääkäreillä. Lääkkeiden interaktiot tulee huomioida paitsi lääkitystä aloittaessa myös lääkkeitä uusittaessa. Potilaalle on voitu aloittaa uusia lääkkeitä uusittavana olevan lääkkeen aloituksen jälkeen, ja tällöin tulee arvioida yksittäisen lääkkeen käyttöindikaation lisäksi kokonaislääkitystä.

Antibiottiresistenssin kasvu on yksi lääketieteen tulevaisuuden suurimmista haasteista, minkä on huomionnut myös muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO. Myös Suomen tulee esimerkillään sitoutua antibiottiresistenssin vastaiseen työhön. Tämän vuoksi oikeus antibiottien määräämiseen tulisi rajata ainoastaan lääkäreille, joilla on koulutuksensa puolesta parhaat valmiudet arvioida sen tarpeellisuutta.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi lääkehoidossa on tärkeää huomioida hoidon indikaatioiden ja odotettavissa olevan hyödyn lisäksi hoidon vasta-aiheet ja haittavaikutukset. Lääkkeiden määrääminen ja uusiminen ilman vastuuta potilaan kokonaishoidosta on riski potilasturvallisuudelle.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	0	0	0	1	0	1	4
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antibioottiresistenssin kasvu on yksi lääketieteen tulevaisuuden suurimmista haasteista, minkä on huomionnut myös muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO. Myös Suomen tulee näin ollen esimerkillään sitoutua antibioottiresistenssin vastaiseen työhön. Tämän vuoksi oikeus antibioottien määräämiseen tulisi rajata ainoastaan lääkäreille, joilla on koulutuksensa puolesta parhaat valmiudet arvioida sen tarpeellisuutta.

9. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluviljelystä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	0	0	0	1	0	1	4
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antibioottiresistenssin kasvu on yksi lääketieteen tulevaisuuden suurimmista haasteista, minkä on huomionnut myös muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO. Myös Suomen tulee näin ollen esimerkillään sitoutua antibioottiresistenssin vastaiseen työhön. Tämän vuoksi oikeus antibioottien määräämiseen tulisi rajata ainoastaan lääkäreille, joilla on koulutuksensa puolesta parhaat valmiudet arvioida sen tarpeellisuutta.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antibioottiresistenssin kasvu on yksi lääketieteen tulevaisuuden suurimmista haasteista, minkä on huomionnut myös muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO. Myös Suomen tulee näin ollen esimerkillään sitoutua antibioottiresistenssin vastaiseen työhön. Tämän vuoksi oikeus antibioottien määräämiseen tulisi rajata ainoastaan lääkäreille, joilla on koulutuksensa puolesta parhaat valmiudet arvioida sen tarpeellisuutta.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksellinen	Melko tarkoituksellinen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	0	0	0	1	0	1	4
R01AC02, levokabastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC03, atselastiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	11	0	11	4

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksellinen	Melko tarkoituksellinen	Melko epätarkoituksellinen	Epätarkoituksellinen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiisaivotulehdusrokote	0	0	0	1	0	1	4
Poistetaan: J07BK, vesirokrokote	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	1	0	0	1	0	2	2,5

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille	0	0	0	0	1	1	5
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	0	1	1	5
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	3	3	5

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitromboottinen hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Näistä lääkkeistä erityisesti ACE-estäjät sekä ATR-salpaajat ovat alttiita muutoksille potilaan terveydentilassa ja niiden turvalliseen käyttöön vaaditaan lääkärin koulutuksessa saatava tietopohja. Sepelvaltimotautiin liittyy suurta kuolleisuutta ja sen lääkityksen tulisi siten tapahtua lääkärin toimesta.

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Tähän lääkeryhmään voi liittyä vakavia haittavaikutuksia mm. johtumishäiriöt, joten lääkityksen arvioon vaaditaan lääkärin koulutuksessa saatava tietopohja.

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	6	0	6	4

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Tähän lääkeryhmään voi liittyä vakavia haittavaikutuksia mm. johtumishäiriöt, joten lääkityksen arvioon vaaditaan lääkärin koulutuksessa saatava tietopohja.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	0	0	0	1	0	1	4
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	0	0	0	1	0	1	4
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Tämän lääkeryhmän lääkkeisiin voi liittyä vakavia haittavaikutuksia esimerkiksi maitohapposidoosi metformiinilla ja hypoglykemia sulfonyyliureoilla. Tästä syystä lääkityksen arvion vaaditaan lääkärin koulutuksessa saatava tietopohja.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksinen	Melko tarkoituksenmuksinen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	0	0	0	1	0	1	4

R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Taudin keskiössä on hyvän hoitotasapainon saavuttaminen pienimmällä tehokkaalla kortikosteroidiannoksella. Tämän toteutuminen vaatii lääkärin arvion.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	0	1	0	1	4
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	10	0	10	4

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	0	0	0	1	0	1	4
M01AE02, naprokseeni	0	0	0	1	0	1	4

N02BE01, parasetamoli	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemaattisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	0	0	0	0	1	1	5
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	0	0	0	0	1	1	5
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	3	3	5

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksellisuus	Epätarkoituksellisuus	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	0	0	0	0	1	1	5

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	0	1	1	5
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	0	1	1	5
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	0	1	1	5
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	4	4	5

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoituksenmuuttaminen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	0	0	0	1	0	1	4
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälalueella, jolla hän tulee lääkeä määräämään.	0	0	0	1	0	1	4
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikois pätevyyden edellyttämä koulutus.	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

-

Olemme lausunnossamme aiemmin tuoneet esille taudinmäärityksen haasteellisuuden. Koulutusvaatimuksia rajattuun lääkemääräämisoikeuteen sairaanhoitajan toteaman hoidon tarpeen perusteella ei tulisi tästä syystä ainakaan heikentää.

NLY ei koe myöskään perusteltuna poistaa koulutuksen aikarajaa, koska laajennetun lääkkeenmääräämisoikeuden perusteluna on pidetty kliinisen työn tukea ja näin ollen lähtökohtana pitäisi olla että reseptioikeutta käyttävät kliinisessä työssä aktiivisesti mukana olevat ja jo pidempään mukana olleet hoitajat.

Jää myös epäselväksi miten ulkomailla suoritettun koulutuksen riittävyyttä pystytään varmentamaan ja valvomaan. Kotimaisen koulutuksen osalta ei puolestaan ole syytä hyväksyä mahdollisesti vanhentuneita opintosuorituksia. Kyseessä oleva koulutus on kuitenkin laajuudeltaan nykymuodossaankin erittäin suppea.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Vuoden 2010 jälkeen maailma on muuttunut. Lääkäreitä on enemmän ja e-resepti tuo palvelut helposti kansalle. Reseptin kirjoittaminen on helpottunut ja resurssit eivät ole enää kynnyksysymys.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)