

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Laurea ammattikorkeakoulu

2. Arvioi ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	1	0	0	0	0	1	1
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Erityisen tärkeää on että terveydenhuollon avohuollon sopimuksella hankitut palvelut tulevat tähän mukaan , sillä monet kunnat ostavat palvelunsa jo nyt yksityisiltä palveluntuottajilta

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	1	0	0	0	0	1	1
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

9. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluviilje-lyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	1	0	0	0	0	1	1
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	1	0	0	0	1	2
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	0	2	0	0	0	2	2

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Tarvitaanko yläikärajaa komplisoitumattoman virtsatie-infektion hoitoon?

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	1	0	0	0	0	1	1
R01AC02, levokabastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AC03, atselastiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	11	0	0	0	0	11	1

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisiaivotulehdusrokote	1	0	0	0	0	1	1
Poistetaan: J07BK, vesirokko	0	0	1	0	0	1	3
Yhteensä	1	0	1	0	0	2	2

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Vaikka vesirokkorokotus kuuluukin kansallisen rokotushjelmaan löytyy aikuisia joilta roketesuoja puuttuu, jotka joutuvat itse kustantamaan rokotteen ja siis tarvitsevat reseptin.

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja esto-geeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	1	0	0	0	0	1	1
C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	1	0	0	0	0	1	1
B01AC06, asetyyliisalisyylihappo; antitromboottinen hoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	9	0	0	0	0	9	1

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	1	0	0	0	0	1	1
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	6	0	0	0	0	6	1

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	1	0	0	0	0	1	1
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	1	0	0	0	0	1	1
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	1	0	0	0	0	1	1
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	9	0	0	0	0	9	1

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	1	0	0	0	0	1	1
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	1	0	0	0	0	1	1
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	1	0	0	0	0	1	1
R03AK07, formoteroli ja budesonide	1	0	0	0	0	1	1
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	5	0	0	0	0	5	1

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoitukseenmukainen	Epätarkoitukseenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	4	0	0	0	0	4	1

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksen mukainen	Melko tarkoituksen mukainen	Melko epätarkoitukseen mukainen	Epätarkoitukseen mukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AE09, levosetiritsiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX13, loratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX18, akrivastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX22, ebastiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX26, feksofenadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX27, desloratadiini	1	0	0	0	0	1	1
R06AX29, bilastiini	1	0	0	0	0	1	1
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	1	0	0	0	0	1	1
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	10	0	0	0	0	10	1

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksen mukainen	Melko tarkoituksen mukainen	Melko epätarkoitukseen mukainen	Epätarkoitukseen mukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo

M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	0	1	0	0	0	1	2
M01AE02, naprokseeni	1	0	0	0	0	1	1
N02BE01, parasetamoli	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	1	0	0	0	3	1,33

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Voisiko olla myös 800mg ibuprofeeni

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuksainen	Melko tarkoituksenmuksainen	Melko epätarkoituksemukainen	Epätarkoituksemukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	0	0	0	0	1	1	5

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Emme koututa ko ammattiryhmää, joten emme voi ottaa kantaa tähän kysymykseen

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuuttaminen	Melko tarkoituksenmuuttaminen	Melko epätarkoitukseenmuuttaminen	Epätarkoitukseenmuuttaminen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	0	1	1	5
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	0	1	1	5
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	0	0	0	0	1	1	5
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	0	0	0	0	1	1	5
Yhteensä	0	0	0	0	4	4	5

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Emme koututa ko ammattiryhmää, joten emme voi ottaa kantaa tähän kysymykseen

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- Tämä on kovin odotettu muutos ja tärkeä lisä sairaanhoitajan lääkkeenmäärämisestä toimiville. Tämä helpottaa työn organisointia ja asiakkaan hoitopolkua!Tämä vastaa osalta hyvin tulevaan Sote uudistukseen

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmuutokset	Melko tarkoituksenmuutokset	Melko epätarkoitukset	Epätarkoitukset	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskisarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	1	0	0	0	0	1	1
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälueella, jolla hän tulee lääketä määräämään.	1	0	0	0	0	1	1
7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- On tärkeää että koulutuksen taso huomioidaan myös ylemmässä ammattikorkeakoulukoulutuksessa. Erittäin hyvä, että hakijoiden hakukelpoisuutta laajennetaan. Nämä muutokset on helppo ottaa huomioon ammattikorkeakouluissa

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)